

Perfil sociodemográfico y clínico de los pacientes en quienes se detecta consumo de cocaína en la atención en un servicio de urgencias de alta complejidad de la ciudad de Medellín.


Berrouet Mejía Marie Claire¹, Hernan Aguirre, Cardona Tobón Carolina, Arias González Camila, Builes Arbeláez Nicole, Peña Camilo, Valencia Lorena

¹Especialista en Toxicología Clínica, Epidemióloga CES, Toxicóloga Hospital General de Medellín, docente Universidad CES líder del grupo HGM-CES. ITTC



Introducción

La cocaína es una de las drogas ilegales más usadas en el mundo, situación similar ocurre en Colombia siendo la cocaína y sus derivados la segunda droga ilegal de mayor consumo.



Métodos

Estudio descriptivo de cohorte retrospectiva, cuyo objetivo es describir el perfil clínico de los pacientes en quienes se detectó consumo de cocaína en el servicio de urgencias de el Hospital General de Medellín.




Resultados

Se evaluaron 214 historias de pacientes la gran mayoría de la población correspondiente a un 73.4% eran hombres y un 26.6% eran mujeres con respecto a la edad se encontró una edad promedio de 31 años siendo el mínimo de edad de 13 años y la edad máxima de 62 años.


La edad promedio de inicio del consumo fue de 18 años con un mínimo 8 y máximo de 55, un 71.2% eran solteros, el 60% no había terminado primaria y un 17.9% eran analfabetas, sólo el 5% de la población tenía estudios de educación superior. Con respecto a la frecuencia de consumo 62.3% referían un consumo del alcaloide diario, 11.4% Interdiario, 13.2% semanal y 6.6% mensual o quincenal. Respecto a la escolaridad se encontró que más de un 60% de la población no había terminado los estudios de primaria se encontró que 17.9% de los pacientes eran analfabetas seguido de un 16.6% que tenían primaria incompleta o sólo el 5% de la población tenía estudios de educación superior. Hasta un 23% de la población reportó condiciones de vulnerabilidad y se encontraba en condición de calle.

Coingestas frecuentes



Con respecto a la frecuencia de consumo 62.3% referían un consumo del alcaloide diario 11.4% interdiario 13.2% semanal y 6.6% mensual y quincenal Con respecto patología dual en el 69.5% de los pacientes dentro de otras comorbilidades estuvieron la presencia de hipertensión arterial en el 4.7% y cardiopatía isquémica en tres personas 1.4% de la población.

Tipo alcaloide



Más del 50% de la población presentó al menos una complicación Dentro de las complicaciones más comunes estuvieron cardiovasculares en el 12.7% neurológicas en el 13% hepáticas en el 4.7% gastrointestinales de tipo pancreatitis el 2.8% renales en el 9.4% y psiquiátricas en el 26.2% ,síndrome de cocaína levamisol se encontró en el 7% de los casos, accidente cerebrovascular hemorrágico en e. 9% de los casos la rabdomiólisis se presentó en 5.1% de los casos, falla renal en 11.2% de los casos de este número 1.4% requirió diálisis.



Conclusiones

Los alcaloides derivados de la cocaína siguen siendo en Colombia un problema en aumento tanto la pasa básica de poca como llor hidrato de cocaína, Han. Mostrado. Tener riesgos que van más allá. De la agitación y el riesgo cardiovascular. Este problema debe ser identificado y manejado tempranamente por los médicos de urgencias.

¡Conoce más escaneando el código QR!

Escanéame